

ESSILOR®
#1

БРЕНД ЛИНЗ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛАМИ ВО ВСЁМ МИРЕ*



Линзы Stellest™ от Essilor®
замедляют прогрессирование
миопии в среднем на 67%**

Линзы Stellest™ от Essilor®

замедляют прогрессирование миопии в среднем на 67%**,
по сравнению с однофокальными линзами при ношении не менее 12 часов в день



Stellest™

Свидетельство на комбинированный товарный знак Essilor №1024167. Свидетельство на товарный знак Stellest №1524065.

** По сравнению с однофокальными линзами при ношении не менее 12 часов в день, ежедневно. Результаты двухлетнего контролируемого, рандомизированного, двойного слепого клинического исследования 2018-2020 – 104 ребенка с миопией разделены на 2 группы: однофокальные линзы (50) и линзы Stellest™ (54).
Результаты оценки эффективности основаны на 32 детях, которые носили линзы Stellest™ не менее 12 часов в день каждый день – Глазная больница Медицинского университета Вэньчжоу – Джей Бао, А. Янг, И. Хуанг, Х. Ли, И. Пан, С. Динг, Е.В. Линч, Джей Жень, Д.П. Спигель, Ч.Л. Вонг, Б. Дробе, Ф. Лю, Х. Чен

* Опрос, проведенный CSA среди репрезентативной выборки из 950 независимых оптометристов в феврале 2019: Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, США, Канада, Бразилия, Китай, Индия.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Рекомендации по выбору дизайна детских линз для контроля миопии

SEE MORE.
DO MORE.



ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ВРАЧОМ И ЗАВИСЯТ ОТ:

Степени миопии
Скорости прогрессирования
Состояния бинокулярного зрения ребенка

STELLEST®

Детские линзы с технологией H.A.L.T.*

myorilux®
Max

Детские бифокальные призматические линзы

myorilux®
Plus

Детские мультифокусные линзы

Более подробная информация по возможностям назначения, выбору дизайна и дополнительных исследованиях содержится в обучающих курсах и вебинарах Essilor Academy

*Кольца высокоасферичных микролинз